

# 禮來乳癌大師開講

Saturday, May 23, 2026

14:40 – 17:40

Lilly  
A MEDICINE COMPANY

 台北寒舍艾美酒店 2F 室宿+角宿廳 臺北市信義區松仁路 38 號

 台中日月千禧酒店 B2 千禧宴會廳 臺中市西屯區市政路 77 號

TIME	TOPIC	SPEAKER	MODERATOR
14:00 – 14:40	Registration		
14:40 – 14:50	Opening remarks		曾令民 醫師 台北榮總
14:50 – 15:20	The risk threshold for high-risk HR+, HER2- eBC	戴明燦 醫師 三軍總醫院	黃俊升 醫師 台大醫院
15:20 – 15:50	Extending survival in HR+/HER2- early breast cancer: evolving strategies in adjuvant therapy	黃柏翔 醫師 台大醫院	
15:50 – 16:00	Break		
16:00 – 16:30	The evolving landscape of adjuvant therapy and real-world data on abemaciclib in HR+, HER2- eBC	林慈恩 醫師 台中榮總	陳達人 醫師 彰基
16:30 – 17:00	The role of abemaciclib in treatment of HR+, HER2- mBC	周政緯 醫師 台中榮總	
17:00 – 17:20	Panel discussion		曾令民 醫師 台北榮總
17:20 – 17:30	Closing		曾令民 醫師 台北榮總

PP-AL-TW-0705-29-Apr-26



捷癌寧® 膜衣錠 50 毫克、100 毫克、150 毫克、200 毫克  
VERZENIO® (abemaciclib) film-coated tablet 50mg, 100mg, 150mg, 200mg

適應症:

#### 1.1 早期乳癌:

• 併用內分泌療法 (tamoxifen 或芳香環酶抑制劑) · 可做為荷爾蒙受體 (HR) 陽性、第二型人類表皮生長因子受體 (HER2) 陰性、淋巴結陽性、高復發風險之早期乳癌成年病人的輔助治療。

#### 1.2 晚期乳癌:

- 併用芳香環酶抑制劑 (aromatase inhibitor) · 可做為治療荷爾蒙受體 (HR) 陽性、第二型人類表皮生長因子受體 (HER2) 陰性之晚期或轉移性乳癌之停經後婦女及男性的第一線內分泌療法 (endocrine-based therapy)。
- 併用 fulvestrant · 可治療荷爾蒙受體 (HR) 陽性、第二型人類表皮生長因子受體 (HER2) 陰性、且接受內分泌療法後疾病惡化之晚期或轉移性乳癌的成人病人。
- 單獨用於治療荷爾蒙受體 (HR) 陽性、第二型人類表皮生長因子受體 (HER2) 陰性、曾經接受過內分泌治療及於轉移後接受化學治療後又發生疾病惡化之晚期或轉移性乳癌的成人病人。

用法用量:

- 與 fulvestrant, 內分泌療法 (tamoxifen 或芳香環酶抑制劑) 併用時 · VERZENIO 的建議劑量為 150 mg · 每日口服兩次。
- 單獨使用時 · VERZENIO 的建議劑量為 200 mg · 每日口服兩次。
- 對於早期乳癌 (EBC) · 持續使用 VERZENIO · 直到 2 年治療結束或直到疾病復發或出現無法耐受的毒性。
- 對於晚期或轉移性乳癌 (MBC) · 持續治療直到疾病惡化或出現無法耐受的毒性。

禁忌: 對於 VERZENIO 內之有效成份或賦形劑過敏者。

警語和注意事項: 腹瀉、嗜中性球低下症、間質性肺病/肺炎、肝毒性、靜脈血栓栓塞、胚胎-胎兒毒性、併用 CYP3A4 誘導劑、嚴重的內臟轉移、乳糖、動脈血栓栓塞事件。

不良反應: 最常見之不良反應包括腹瀉、感染、嗜中性球低下症、貧血、疲倦、噁心、嘔吐和食慾不振。

使用前請詳閱 VERZENIO® 藥品仿單警語及注意事項。

VERZENIO 50 毫克 衛部藥輸字第 027643 號

VERZENIO 100 毫克 衛部藥輸字第 027642 號

VERZENIO 150 毫克 衛部藥輸字第 027641 號

VERZENIO 200 毫克 衛部藥輸字第 027640 號

台灣禮來股份有限公司

台北市信義區松高路 9、11 號 14 樓

P-MED-RA-007-25-Jun-02